



失語症居家實用指南

有關失語症：失語症常見症狀

1 失語症症狀

患者可以出現同時多於一種症狀

命名困難 ANOMIA

找字困難，難以選取及運用適合的詞語
例子：以「用黎寫字嘅嘢」作表達而無法說出「筆」字



音素性錯語症

PHONEMIC PARAPHASIA

替換語音
例子：將「紙巾」說成「匙羹」



語義性錯語症

SEMANTIC PARAPHASIA

替換詞語
例子：將「櫈」說成「枱」



亂語症 JARGONS

流暢地組合無意義及/或正確的詞語/語句，組成缺乏語義的句子或短語
例子：「我食蘋果」說成「我去學校踢橙」

我去學校踢橙



新詞症 NEOLOGISMS

創造溝通對象無法理解或辨識的新詞
例子：將「蘋果」說成「日腦」



語法缺失 AGRAMMATISM

省略語法標記或出現語序錯誤
例子：「我食蘋果」說成「我蘋果食」

我蘋果食，
我幫買！



電報式語言

TELEGRAPHIC SPEECH

省略功能詞（例如「嘅」、「個」等）

呢...蘋果，
幫我...買七。



說話期間出現斷續或感到費力，
花更長時間組織句子

EFFORTFUL SPEECH

例子：「我...想...我想食...唔知」

我...想...我想
食.....唔知



2 失語症治療

- 向言語治療師尋求專業協助，以改善失語症患者的溝通狀況
- 言語治療師將進行評估並協助設定目標，透過治療方案強化語言能力、彌補功能損傷，幫助患者重新參與生活

失語症訓練應用程式



下載單張



① 本指南僅供資訊參考之用。如需制定正式的管理計畫或獲取進一步詳情，請向言語治療師尋求建議。

資料來源

- AMERICAN SPEECH-LANGUAGE-HEARING ASSOCIATION. (N.D.). APHASIA. PRACTICE PORTAL. RETRIEVED SEPTEMBER 22, 2024, FROM [HTTPS://WWW.ASHA.ORG/PRACTICE-PORTAL/CLINICAL-TOPICS/APHASIA/](https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/aphasia/)

主辦機構

撥款資助

項目培訓